

PAROXÉTINE BIOGARAN

Antidépresseur

Ce médicament est un générique de DEROXAT

Dans quel cas le médicament PAROXÉTINE BIOGARAN est-il prescrit ?

Ce médicament est un antidépresseur qui appartient à la famille des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine.

Il est utilisé dans le traitement :

- des états dépressifs,
- des troubles obsessionnels compulsifs,
- des attaques de panique,
- de certaines manifestations de l'anxiété (anxiété généralisée, phobie sociale).

Présentations du médicament PAROXÉTINE BIOGARAN

PAROXÉTINE BIOGARAN : comprimé sécable ; boîte de 14
Sur ordonnance (Liste I) - Remboursable à 65 % - **Prix : 5,77 €.**

Composition du médicament PAROXÉTINE BIOGARAN

Paroxétine 20 mg p cp

Substance active : Paroxétine chlorhydrate hémihydrate
Excipients : Hypromellose, Macrogol 400, Magnésium stéarate, Phosphate dicalcique dihydrate, Polysorbate 80, Sodium carboxyméthylamidon, Titane dioxyde

Contre-indications du médicament PAROXÉTINE BIOGARAN

Ce médicament ne doit pas être utilisé en association avec les IMAO ou les médicaments contenant du pimozide ou de la thioridazine.

Attention

Les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, notamment lorsqu'ils sont associés à des médicaments qui augmentent le taux de sérotonine, peuvent être responsables d'une affection rarissime, mais potentiellement grave : le syndrome sérotoninergique. En cas de survenue des plusieurs symptômes tels que fièvre inexpliquée, sueurs, contractions musculaires involontaires, agitation, confusion, ne poursuivez pas le traitement sans avis médical.

L'utilisation des antidépresseurs est déconseillée avant l'âge de 18 ans. Des études ont en effet montré que l'utilisation d'un antidépresseur peut augmenter le risque de suicide chez les adolescents souffrant de dépression. Chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans, ce traitement est par conséquent réservé à certains cas graves et nécessite une surveillance médicale particulière et la vigilance de l'entourage.

La prudence s'impose dans certaines situations : personne âgée, épilepsie (même ancienne), glaucome à angle fermé, diabète, insuffisance hépatique, insuffisance rénale grave, prédisposition aux hémorragies, maladie cardiaque.

Tous les traitements antidépresseurs sont susceptibles d'induire un épisode maniaque chez les personnes prédisposées : en cas d'euphorie, d'excitation inhabituelle ou de comportement anormal survenant sous traitement, une consultation médicale rapide est nécessaire.

Bien qu'aucune interaction nette n'ait été constatée avec l'alcool, évitez la prise de boissons alcoolisées, comme avec tout médicament psychotrope.



Si vous devez conduire ou utiliser une machine dangereuse, assurez-vous préalablement que ce médicament n'altère pas votre vigilance.

Interactions du médicament PAROXÉTINE BIOGARAN avec d'autres substances

Ce médicament ne doit pas être associé :

- aux IMAO (**MARSILID, MOCLAMINE**) : des délais précis doivent être respectés entre la fin d'un traitement par IMAO et le début de ce traitement, et inversement ;
- aux médicaments contenant du pimozide ou de la thioridazine : risque de troubles du rythme cardiaque.

Il peut interagir avec les médicaments contenant du tamoxifène ou du métoprolol.

Informez par ailleurs votre médecin si vous prenez un antimigraineux de la famille des triptans, un anticoagulant oral, de l'aspirine, un AINS, un antiarythmique (propafénone, flécaïnide), un antidépresseur imipraminique, un médicament contenant du lithium, du tramadol, de la rispéridone ou un produit de phytothérapie contenant du millepertuis.

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse :

Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sans avis médical. Son utilisation en fin de grossesse doit être signalée au médecin ou à la sage-femme ; en effet, une insuffisance respiratoire ou des difficultés à s'alimenter peuvent survenir chez les nouveau-nés d'une mère traitée par un antidépresseur inhibiteur de la recapture de la sérotonine avant l'accouchement. Ces risques peuvent être prévenus par une surveillance médicale renforcée et un éventuel traitement.

Allaitement :

Ce médicament passe très faiblement dans le lait maternel : l'allaitement est possible pendant le traitement.

Mode d'emploi et posologie du médicament PAROXÉTINE BIOGARAN

Ce médicament doit être pris de préférence le matin, au cours du petit déjeuner.

Les comprimés doivent être avalés plutôt que croqués.

Posologie usuelle :

- Adulte de plus de 18 ans :

- états dépressifs, manifestations de l'anxiété : 20 mg par jour, soit 1 comprimé par jour. La dose peut être augmentée si nécessaire jusqu'à 50 mg par jour ;
- troubles obsessionnels compulsifs, attaques de panique : 40 mg par jour ; si nécessaire, jusqu'à 60 mg par jour.

Conseils

L'efficacité des antidépresseurs n'est généralement pas immédiate. Un délai pouvant atteindre plusieurs semaines est parfois nécessaire pour que les effets bénéfiques se fassent sentir. Les effets indésirables éventuels apparaissant en début de traitement ne doivent pas vous conduire à l'arrêter prématurément.

Chez la personne souffrant de dépression, un état anxieux peut apparaître ou s'aggraver en début de traitement ; un anxiolytique est parfois prescrit de manière temporaire par le médecin pour prévenir ou traiter ces manifestations.

Lorsque les symptômes de la dépression ont disparu, le traitement doit absolument être poursuivi pendant la durée prescrite afin de consolider la guérison. Un arrêt prématuré exposerait à une rechute. La durée d'un traitement antidépresseur est rarement inférieure à 6 mois.

Les antidépresseurs ne créent pas de dépendance. Néanmoins, il est préférable d'arrêter le traitement progressivement en diminuant la posologie ou en espaçant les prises pour éviter les effets indésirables transitoires observés en cas d'interruption brutale.

Effets indésirables possibles du médicament PAROXÉTINE BIOGARAN

La survenue des effets indésirables est plus fréquente au cours des premières semaines de traitement. Ceux-ci s'estompent le plus souvent ensuite.

Très fréquents (plus de 1 patient sur 10) : nausées, troubles sexuels.

Fréquents : diminution de l'appétit, somnolence ou au contraire insomnie, rêves anormaux, cauchemars, sensations vertigineuses, tremblements, maux de tête, manque d'attention, vision trouble, bâillements, vomissements, constipation, diarrhée, sécheresse buccale, transpiration excessive, fatigue, prise de poids, augmentation du taux de cholestérol dans le sang.

Plus rarement : confusion des idées, hallucinations, anxiété, idées suicidaires, convulsions, douleurs articulaires ou musculaires, mouvements involontaires, difficulté à uriner ou au contraire incontinence urinaire, bourdonnement d'oreille, dilatation de la pupille, saignements (notamment ecchymoses ou hémorragie digestive), éruption cutanée, modification de la tension artérielle, écoulement de lait par le mamelon, priapisme, réaction allergique, baisse du taux de sodium dans le sang, élévation des transaminases.

Les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine peuvent également provoquer une agitation désagréable et un besoin irrésistible de bouger (impossibilité à rester assis ou debout tranquillement). Si ces troubles surviennent, contactez votre médecin.

Vous avez ressenti un effet indésirable susceptible d'être dû à ce médicament, vous pouvez le déclarer en téléchargeant le formulaire.

©Laboratoire Biogaran
Mis à jour : Jeudi, 23 Mai 2013.