

ACETYLLEUCINE MYLAN

Traitement symptomatique de la crise vertigineuse.

pathologies pour lesquelles il peut-être prescrit

- Crise vertigineuse

Classe thérapeutique	<u>Neurologie-psychiatrie</u>
Principes actifs	<u>Acétylleucine</u>
Excipients	Amidon de maïs, Calcium carbonate, Magnésium stéarate (E572)
Statut	Ce médicament est NON SOUMIS A PRESCRIPTION MEDICALE
Prix de vente TTC	4,25 €
Tx de remboursement SS	30 %
Laboratoire	<u>Mylan</u>

Présentation Précautions Grossesse et allaitement Effets indésirables

Posologie : Chez l'adulte

1,5 à 2 g par jour, soit 3 à 4 comprimés par jour, en deux prises matin et soir.

La durée du traitement est variable selon l'évolution clinique (entre 10 jours et 5 à 6 semaines); au début du traitement ou en cas d'insuccès, la posologie peut être augmentée sans inconvénient jusqu'à 3 g et même 4 g par jour.

Mode d'administration : Voie orale.

Aspect et forme : Comprimé blanc, biconvexe et de forme allongée.

Classe pharmacothérapeutique :

ANTIVERTIGINEUX DE MÉCANISME D'ACTION INCONNU

Code ATC : **N07CA04**.