Titre :	Diagnostic différentiel ADHD / Bipolarité par une étude de l'évolution développementale de la sémiologie enfants - adultes
Langue du document :	français
Auteur, co-auteur :	SCHOLL, Jean-Marc *[Centre Hospitalier Universitaire de Liège - CHU > > Centre de référence de l'autisme >]* PHILIPPE, Paule *[Centre Hospitalier Universitaire de Liège - CHU > > Centre de référence de l'autisme >]*
Date de publication :	jan-2011
Nombre de pages :	80x100cm
Peer reviewed :	Oui
Sur invitation :	Non
Manifestation/périodique à portée :	Internationale
Nom de la manifestation :	11ème Congrès de l'Encéphale
Date(s) de la manifestation :	Du 19 janvier 2000 11 au 21 janvier 2011
Organisateur(s) de la manifestation :	L'Association Française de Psychiatrie Biologique
Ville de la manifestation :	Palais des Congrès, Paris
Pays de la manifestation :	France
Mots-clés :	[fr] Diagnostics différentiels ; Bipolarité ; ADHD ; Recherche développementale ; Sémiologie dimensionnelle ; Évolution développementale ; Psychopathologie développementale. ; Tempérament maniaque bipolaire ; Troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité
Résumé :	[fr] Introduction : La prévalence du Trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité (ADHD, TDA/H) est de 3 à 5 % pour les enfants et de 1,9 à 7,3 % pour les adultes dans différentes pays (Kessler et al., 2006; Fayyad et al., 2007). Le Trouble bipolaire a une prévalence chez l'adulte de 1 % pour le type I et de 4,4 % pour le spectre bipolaire (Merikangas et al., 2007), chez l'adolescent elle est évaluée à 1 % pour le type I et le spectre bipolaire en population juvénile à 6 % (2 à 15) (Benazzi, 2007). Des controverses demeurent quant au recouvrement de ces différentes entités cliniques selon les âges. Gabrielle Carlson a décrit chez l'enfant un tableau bipolaire comportant des symptômes maniaques continus et chroniques avec des symptômes d'ADHD. Ainsi, le « National Institutes of Health (NIH) » a distingué cette forme continue du trouble dans l'enfance, le « severe mood dysregulation », du trouble bipolaire de type I de l'adolescent, le « narrow phenotype » comportant des épisodes thymiques et

©http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/116441

	davantage de symptômes psychotiques. Dans une population d'enfants maniaques bipolaires les études rapportent 57 à 98 % d'ADHD en comorbidité. Par contre, dans une population d'enfants ADHD, la comorbidité avec les états bipolaires est de 11 à 22 % (Angold et al., 1999 ; Carlson, 1998 ; Singh et al., 2006). Objectif : Affiner « une sémiologie développementale » et le diagnostic différentiel ADHD/Bipolarité Méthode : Étude qualitative avec observation et « anamnèse sémiologique » détaillée d'un maximum de micro-signes ; échantillons: 14 enfants (5 à 10 ans) et 7 adultes (20 à 37 ans) avec ADHD seul et 170 enfants (2 à 10 ans) et 55 adultes (19 à 61 ans) avec des caractéristiques bipolaires (selon le DSM IV). Résultat : Proposition d'un "tempérament maniaque bipolaire simple" en 7 axes sémiologiques : 1. forme super-énergétique, 2. clinique du sommeil, 3. "mal-être en situation d'être seul", 4. labilité émotionnelle, 5. excitabilité-désinhibitions, 6. prépondérance de l'attention divergente sur l'attention convergente, 7. tendance à l'hyperactivité. L'ADHD ne comporte que 1, 6 et 7. Réf.: « Bipolarité et ADHD. Recherche sémiologique : continuum développemental de la petite enfance à l'âge adulte et diagnostic différentiel », La Psychiatrie de l'enfant, vol. 55/2012, in press.
Intitulé du projet de recherche :	Thèse de doctorat en médecine : recherche sémiologique dimensionnelle et développementale en pédopsychiatrie
Public cible :	Chercheurs ; Professionnels du domaine ; Étudiants
URL permanente :	http://hdl.handle.net/2268/116441
Mentions exigées par l'éditeur pour l'OA :	ISSN 0013-7006 ; L'Encéphale, volume 37, janvier 2011 ; PO 278
Commentaires :	VOIR d'autres développements dans : Réf.: JM SCHOLL & P PHILIPPE, « Bipolarité et ADHD. Recherche sémiologique : continuum développemental de la petite enfance à l'âge adulte et diagnostic différentiel », La Psychiatrie de l'enfant, vol. 55/2012, in press (juin 2012).

©http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/116441