

ZOLPIDEM MYLAN

Hypnotique

Ce médicament est un générique de STILNOX

Dans quel cas le médicament ZOLPIDEM MYLAN est-il prescrit ?

Ce médicament est un hypnotique (somnifère) dont les propriétés sont proches de celles des benzodiazépines.

Il est utilisé dans le traitement de l'insomnie.

Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants :

- Insomnie

Présentations du médicament ZOLPIDEM MYLAN

ZOLPIDEM MYLAN 10 mg : comprimé sécable (blanc) ; boîte de 14
Sur ordonnance (Liste I), durée de prescription limitée à 4 semaines - Remboursable à 15 % - **Prix : 1,78 €.**

Substance active : Zolpidem tartrate

Excipients : Amidon prégélatinisé, Cellulose microcristalline, Hypromellose, Lactose monohydrate, Macrogol 400, Magnésium stéarate, Opadry blanc YS-1-7003, Polysorbate 80, Titane dioxyde

Contre-indications du médicament ZOLPIDEM MYLAN

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- insuffisance respiratoire grave,
- insuffisance hépatique grave,
- syndrome d'apnée du sommeil,
- myasthénie.

Interactions du médicament ZOLPIDEM MYLAN avec d'autres substances

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres sédatifs (tranquillisants, somnifères, certains médicaments contre la toux ou contre la douleur contenant des opiacés, antidépresseurs, neuroleptiques...).

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse :

Ce médicament ne doit pas être utilisé sans avis médical pendant la grossesse. Les fortes doses au cours des 6 derniers mois sont déconseillées. En fin de grossesse, un traitement par benzodiazépine, même à faible dose, peut être responsable d'effets indésirables chez

le nouveau-né : une surveillance médicale du nouveau-né est alors nécessaire pendant 1 à 3 semaines selon les cas.

Allaitement :

Ce médicament passe dans le lait maternel : l'allaitement est déconseillé.

Mode d'emploi et posologie du médicament ZOLPIDEM MYLAN

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau juste avant le coucher.

Posologie usuelle :

- Adulte : 1 comprimé, le soir au coucher.
- Personne de plus de 65 ans, insuffisant hépatique ou respiratoire : 1/2 comprimé, le soir au coucher.

Effets indésirables possibles du médicament ZOLPIDEM MYLAN

Sensation d'ivresse, maux de tête, troubles de la coordination des mouvements, somnolence pendant la journée, cauchemars, aggravation de l'insomnie, baisse de la libido.

Fatigue, faiblesse musculaire.

Réaction allergique cutanée, démangeaisons.

Troubles digestifs.

Vision double.

Dans certaines circonstances et chez certaines personnes :

- réactions paradoxales avec augmentation de l'anxiété, agitation, agressivité, confusion des idées, hallucinations ;
- amnésie antérograde.

Ces troubles nécessitent l'arrêt du traitement.

Cet article a été téléchargé à partir du lien ci-après :
©<http://www.eurekasante.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp1430-ZOLPIDEM-MYLAN.html>

L'utilisation de cet article reste sous l'autorisation de :
<http://www.eurekasante.fr/>