

Cours De Résidanat

Sujet: 69

Troubles anxieux

Diagnostic et Traitement

Objectifs :

1. Distinguer l'anxiété normale de l'anxiété pathologique sur des arguments anamnestiques et cliniques.
2. Etablir le diagnostic positif d'un trouble panique et d'un trouble anxiété généralisée, à partir des données de l'anamnèse et de l'examen psychiatrique.
3. Etablir le diagnostic positif d'une agoraphobie, d'une phobie spécifique et d'une phobie sociale, à partir des données de l'anamnèse et de l'examen psychiatrique.
4. Etablir le diagnostic positif d'un trouble anxiété de séparation de l'enfant, à partir des données anamnestiques et cliniques.
5. Différencier les troubles anxieux du trouble obsessionnel compulsif et de l'état de stress post-traumatique, à partir des données anamnestiques et cliniques.
6. Etablir les diagnostics différentiels des troubles anxieux.
7. Planifier la conduite du traitement symptomatique et du traitement de fond des différents troubles anxieux.
8. Décrire les propriétés pharmacodynamiques des anxiolytiques.
9. Décrire les règles de prescription des anxiolytiques.
10. Citer les méthodes psychothérapeutiques qui s'appliquent à la prise en charge des différents troubles anxieux.

Objectif 1: Distinguer l'anxiété normale de l'anxiété pathologique sur des arguments anamnestiques et cliniques.

1- Introduction

Les troubles anxieux, anciennement appelés névroses, constituent l'un des problèmes de santé mentale les plus courants, touchant jusqu'à 20 % de la population générale. Les troubles anxieux débutent le plus souvent à l'adolescence ou chez l'adulte jeune avec une prédominance féminine. La triade clinique de l'anxiété regroupe des symptômes psychiques, somatiques et comportementaux.

Les troubles anxieux entraînent des problèmes de fonctionnement sur les plans social, familial, scolaire et professionnel. Les troubles anxieux augmentent le risque d'autres troubles psychiatriques, notamment la dépression, l'abus de drogues et d'alcool et l'incidence du suicide.

Le trépied thérapeutique repose sur les antidépresseurs, la psychothérapie et les mesures psychosociales.

2- Définitions

Les troubles anxieux constituent un ensemble hétérogène de pathologies dont l'anxiété occupe une place centrale. L'anxiété est un état émotionnel anticipant un événement menaçant et caractérisé par des sentiments pénibles de peur, d'alerte, d'hypervigilance, d'appréhension et de crainte d'un danger imminent, associés à des manifestations neurovégétatives.

L'anxiété est dite normale quand elle est une réponse adaptée à une situation réellement menaçante, donc contrôlable et tolérable.

L'anxiété pathologique est en revanche une réponse inadaptée à cause de son intensité, de sa durée, de sa fréquence, de la souffrance et le dysfonctionnement qu'elle entraîne.

Peur normale	Peur pathologique
Emotion naturelle	Pathologie
L'intensité est limitée et contrôlable	Difficilement contrôlable, Intensité variable mais peut aller jusqu'à la panique.
Les situations sont objectivement dangereuses	Les situations sont non dangereuses
Les évitements sont modérés et adaptés, le handicap est limité.	Les évitements sont importants et le handicap significatif
Peu d'anxiété anticipatoire	Anticipation anxieuse importante et la vie peut s'organiser autour de la peur.
Les confrontations répétées peuvent diminuer l'intensité de la peur	Les confrontations répétées ne font pas diminuer la peur (fuite)

Le principal critère pour différencier l'anxiété normale de l'anxiété pathologique reste le retentissement de celle-ci sur les capacités d'adaptation du sujet.

3- Classification

Dans la nosographie actuelle (DSM 5) on trouve 6 troubles anxieux :

- Trouble panique,
- Trouble anxiété généralisée,
- Agoraphobie,
- Phobie spécifique,
- Trouble anxiété sociale (Phobie sociale),
- Trouble anxiété de séparation.

Objectif 2: Etablir le diagnostic positif d'un trouble panique et d'un trouble anxiété généralisée, à partir des données de l'anamnèse et de l'examen psychiatrique.

1- Trouble panique

1-1- Définition

Le trouble panique est caractérisé par la survenue récurrente d'attaque de panique (aux moins 2) ou crises d'angoisses répétitives, durant les 4 dernières semaines.

1-2- Attaque de panique

L'attaque de panique est un état d'anxiété extrêmement **intense** et de durée **brève**.

La survenue est paroxystique, de façon brutale, de manière inopinée ou rapidement progressive. Le plus souvent la crise est spontanée et sans cause déclenchante. La crise peut survenir au cours du sommeil réveillant le patient. L'épisode dure de quelques minutes à

N° Validation : 0869201959

plusieurs heures (**en moyenne 20 à 30 minutes**). Les symptômes atteignent une intensité maximale en moins de 10 minutes. La résolution est progressive laissant le patient épuisé avec une profonde asthénie.

La triade symptomatique : Sémiologie psychique, physique et comportementale.

L'attaque de panique regroupe au moins **4** signes de la triade suscitée.

- **Sémiologie psychique** : il s'agit soit d'une sensation de mort imminente, soit du sentiment de devenir fou. Les patients décrivent alors une impression d'irréalité de l'ambiance et de dépersonnalisation leur faisant parfois craindre de commettre des actes incontrôlés. L'ensemble de ces phénomènes créent une angoisse intense, un état de panique.

- **Sémiologie physique** : elle domine souvent le tableau, conduisant le patient aux urgences médicales ou chez le cardiologue. Les principales manifestations somatiques de l'anxiété aiguë sont les suivantes :

*cardiaques : palpitations et tachycardie, gêne ou même douleur rétrosternale

*respiratoires : sensation d'étouffement, de dyspnée

*neurologiques : vertiges, paresthésies, céphalées

*neurovégétatives : hypersudation, bouffées de chaleur, frissons, tremblements

*plus rarement on peut observer des symptômes digestifs (nausées, douleurs abdominales, diarrhées), des symptômes urinaires (pollakiurie, mictions impérieuses).

- **Sémiologie comportementale** : des troubles du comportement paroxystiques plus ou moins graves peuvent être observés : sidération, fuite, attaques de colère, accès de violence hétéro ou auto-agressive pouvant aller jusqu'à des comportements suicidaires impulsifs (précipitation d'une fenêtre, sous une voiture...), prise de grandes quantités d'alcool ou de psychotropes. Ces troubles ont pour caractéristiques d'être paroxystiques, répétitifs. En dehors des accès, les patients sont capables de les critiquer. Ils les décrivent en termes de « besoin incoercible ». Ces troubles du comportement représentent du fait de leur dangerosité éventuelle, la principale complication des crises d'angoisse aiguës. Le risque majeur est le raptus anxieux.

1-3- Diagnostic positif d'un trouble panique

Les critères du DSM 5 d'un trouble panique :

A. Attaques de panique récurrentes et inattendues (au moins 2 crises).

B. Au moins une des attaques s'est accompagnée pendant un mois « ou plus » de l'un « ou plus » des symptômes suivants :

(a) Crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique « peur d'avoir peur ».

N° Validation : 0869201959

(b) Préoccupations à propos des implications possibles de l'attaque ou bien de ses conséquences.

(c) Changement de comportement important en relation avec les attaques.

C. Les attaques de panique ne sont pas dues aux effets physiologiques directs d'une substance ou d'une affection médicale générale.

D. Les attaques de panique ne sont pas mieux expliquées par un autre trouble mental.

NB : Le trouble panique se complique fréquemment d'agoraphobie.

2- Trouble anxiété généralisée

2-1- Définition

Le trouble anxiété généralisée appelé « maladie des inquiétudes », est défini comme une anxiété de fond et des soucis excessifs, incontrôlables, chroniques (au moins 6 mois), relatifs à des situations réalistes banales, à l'origine d'un état de souffrance qui altère le fonctionnement du patient dans sa vie courante, associés à des symptômes physiques traduisant la tension motrice et l'hypervigilance.

2-2- Etude clinique

a- Symptomatologie psychique

- * Soucis excessifs persistants, chroniques et non justifiés.
- * Inquiétudes envahissantes, diffuses et incontrôlables.
- * Intolérance à l'incertitude.
- * Sentiment d'insécurité ou d'attente.

b- Symptomatologie somatique

- Tension motrice : fatigabilité, céphalées et tremblements....
- Hyperactivité neurovégétative : transpiration, palpitation, bouffées de chaleurs...
- Autres plaintes somatiques : épigastralgies, spasmes musculaires, dyspnée....

c- Symptomatologie comportementale

- ✓ Etat d'hypervigilance.
- ✓ Irritabilité, nervosité.
- ✓ Insomnie.
- ✓ Agitation.

2-3- Diagnostic positif

Critères diagnostiques du DSM 5 d'un trouble anxiété généralisée :

A. Anxiété et soucis excessifs « attente avec appréhension » survenant la plupart du temps durant au moins 6 mois concernant au moins deux thèmes différents «famille, travail, santé ou autres domaines».

B. La personne éprouve de la difficulté à contrôler cette préoccupation.

C. L'anxiété et les soucis sont associés à trois « ou plus » des six symptômes suivants :

- 1) Agitation ou sensation d'être survolé ou à bout.
- 2) Fatigabilité.
- 3) Difficultés de concentration ou trous de la mémoire.
- 4) Irritabilité.
- 5) Tension musculaire.
- 6) Perturbation du sommeil

D. L'objet de l'anxiété et des soucis n'est pas limité aux manifestations d'une autre pathologie mentale.

Les complications sont fréquentes : surconsommation médicamenteuse, addictions à l'alcool, et/ou aux benzodiazépines (automédication de l'anxiété), décompensations dépressives, développement d'un autre trouble anxieux, dysfonctionnement familial, social et professionnel, maladies psychosomatiques : HTA, ulcère gastroduodéal.

Objectif 3 : Etablir le diagnostic positif d'une agoraphobie, d'une phobie spécifique et d'une phobie sociale, à partir des données de l'anamnèse et de l'examen psychiatrique.

1-Agoraphobie

1-1- Définition

L'agoraphobie est un trouble anxieux type phobique caractérisé par la peur des espaces ou il pourrait être difficile de s'échapper ou dans lesquelles il pourrait être difficile d'obtenir du secours en cas de problème. Cette peur est à l'origine du déclenchement d'attaques de panique lorsque le sujet se trouve confronté à la situation redoutée.

1-2- Etude clinique

La caractéristique essentielle de l'agoraphobie est une anxiété liée au fait de se trouver dans des endroits ou des situations où il pourrait être difficile (ou gênant) de s'échapper ou dans lesquelles aucun secours ne pourrait être trouvé en cas de survenue d'une attaque de panique

ou des symptômes de type panique (p. ex., peur d'avoir une attaque subite de vertige ou une crise de diarrhée soudaine).

L'anxiété conduit typiquement à un évitement envahissant de nombreuses situations pouvant inclure le fait d'être seul hors de son domicile ou d'être seul chez soi; d'être dans une foule; de voyager en voiture, de prendre les transports en commun, de faire ses courses dans les grandes surfaces, Certains sujets sont capables de s'exposer eux-mêmes aux situations redoutées mais ils subissent ces expériences avec une crainte considérable.

L'évitement de situations peut altérer les capacités des sujets à voyager, à travailler ou à assumer leurs responsabilités domestiques (p. ex., faire des courses dans une épicerie, amener les enfants chez le médecin) avec la peur de quitter une " zone de sécurité ". Les conduites contraphobiques (de réassurance) sont fréquentes : consistera à être accompagné d'une personne de confiance susceptible de protéger la personne en cas de confrontation avec l'objet phobogène.

1-3- Diagnostic positif

Critères diagnostiques du DSM 5 d'une agoraphobie :

A. Anxiété liée au fait de se retrouver dans des endroits ou des situations d'où il pourrait être difficile « ou gênant » de s'échapper ou dans lesquelles on pourrait ne pas trouver de secours en cas d'attaque de panique soit inattendue soit facilitée par des situations spécifiques ou bien en cas de symptômes à type de panique.

B. Les situations sont soit évitées, soit subites avec une souffrance intense ou bien avec la crainte d'avoir une attaque de panique ou des symptômes à type de panique ou bien nécessitent la présence d'un accompagnant.

C. L'anxiété ou l'évitement phobique n'est pas mieux expliqué par un autre trouble mental.

2- Phobie spécifique

2-1- Définition

La caractéristique essentielle de la phobie spécifique est une peur marquée et persistante d'objets ou de situations objectivement visibles et circonscrits.

L'exposition au stimulus phobogène provoque presque invariablement une réponse anxieuse immédiate. Cette réponse peut prendre la forme d'une attaque de panique situationnellement liée ou facilitée par les situations.

Le plus souvent, le stimulus phobogène est évité bien que parfois le sujet ait à l'endurer avec une grande souffrance.

2-2- Etude clinique

Les formes cliniques des phobies spécifiques :

Type animal « zoophobie » : ce sous-type doit être spécifié si la peur est induite par les animaux ou les insectes: (araignées, souris...).

Type environnement naturel: ce sous-type doit être spécifié si la peur est induite par des éléments de l'environnement naturel tels les orages, les hauteurs « acrophobie » ou l'eau.

Type sang — injection — accident: ce sous-type doit être spécifié si la peur est induite par le fait de voir du sang ou un accident ou d'avoir une injection ou toute autre procédure médicale invasive.

Type situationnel: ce sous-type doit être spécifié si la peur est induite par une situation spécifique tels les espaces clos « claustrophobie », les tunnels, les ponts, les voyages aériens,...

2-3- Diagnostic positif

Critères diagnostiques du DSM 5 d'une phobie spécifique :

- A. Peur persistante et intense à caractère irraisonné ou bien excessive, déclenchée par la présence ou l'anticipation de la confrontation à un objet ou une situation spécifique.
- B. L'exposition au stimulus phobogène provoque de façon quasi-systématique une réaction anxieuse immédiate qui peut prendre la forme d'une attaque de panique.
- C. Le sujet reconnaît le caractère excessif ou irrationnel de la peur.
- D. La situation phobogène est évitée ou vécue avec une anxiété ou détresse intense.
- E. L'évitement, l'anticipation anxieuse ou la souffrance de la situation redoutée perturbent, de façon importante les habitudes de l'individu, ses activités professionnelles ou bien ses activités sociales ou ses relations avec autrui, ou bien le fait d'avoir cette phobie s'accompagne d'un sentiment de souffrance important.
- F. Chez les individus de moins de 18 ans, la durée est d'au moins de 06 mois.
- G. L'anxiété, les attaques de panique ou l'évitement phobique associé à l'objet ou à la situation spécifique ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental.

3- trouble anxiété sociale (phobie sociale)

3-1- Définition

Les phobies sociales correspondent à l'anticipation anxieuse et à l'évitement de certaines situations sociales dans les quelles le sujet pourrait être observé par autrui ou se conduire de

manière humiliante ou embarrassante. L'exposition à la situation sociale ou de performance provoque presque invariablement une réponse anxieuse immédiate.

3-2- Etude clinique

- Les situations sociales sources d'anxiété : situations de performance, d'observation, d'affirmation ou d'interaction.
- Troubles cognitifs : sentiments de crainte et de honte.
- Troubles de comportement : évitements, conduite de réassurance, objet contraphobique.

Il y a deux formes cliniques : limitée (à une situation sociale) et généralisée.

3-3- Diagnostic positif

Critères diagnostiques du DSM 5 d'une phobie sociale :

A. Une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou bien de situations de performance durant lesquelles le sujet est en contact avec des gens non familiers ou bien peut être exposé à l'éventuelle observation attentive d'autrui.

B. L'exposition à la situation sociale redoutée provoque de façon quasi-systématique une anxiété qui peut prendre la forme d'une attaque de panique.

C. Le sujet reconnaît le caractère excessif ou irraisonnée de la peur.

D. Les situations sociales ou de performance sont évitées ou vécues avec une anxiété et une détresse intense.

E. L'évitement, l'anticipation anxieuse ou la souffrance dans la situation redoutée sociale ou de performance perturbent, de façon importante, les habitudes de l'individu, ses activités professionnelles, ou bien ses activités sociales ou ses relations avec autrui, ou bien le fait d'avoir cette phobie s'accompagne d'un sentiment de souffrance important.

F. Chez les individus de moins de 18 ans, la durée est d'au moins 06 mois.

G. La peur ou le comportement d'évitement n'est pas lié aux effets physiologiques directs d'une substance, ni à une affection médicale générale et n'est pas mieux expliqué par un autre trouble mental.

N.B. La timidité n'est pas une phobie sociale car l'anxiété est minime, l'évitement n'est pas constant, il n'y a pas d'altération du fonctionnement ni de souffrance psychologique.

Objectif 4 : Etablir le diagnostic positif d'un trouble anxiété de séparation de l'enfant, à partir des données anamnestiques et cliniques.

1- Définition

L'anxiété de séparation affecte les enfants ou les adolescents. Elle se caractérise par une anxiété excessive lorsque le sujet est séparé des personnes auxquelles il est attaché.

2-Etude clinique

- Détresse excessive dans les situations de séparation (ou en anticipation de ces séparations) avec les figures d'attachement.
- Crainte persistante de la disparition de ces figures d'attachement.
- Ces craintes amènent à des équivalents d'évitements :
 - *Refus d'aller à l'école par peur de la séparation.
 - *Refus de rester seul ou hors de la présence des figures d'attachement.
 - *Refus de dormir sans la présence d'une figure d'attachement.
- Cauchemars répétés sur ce thème de séparation.
- Plaintes somatiques ou fonctionnelles lors des séparations.
- Avant 6 ans, la présence de quelques symptômes d'anxiété de séparation est physiologique.
- C'est l'altération du fonctionnement social ou scolaire, ou l'intensité de la détresse provoquée qui font le caractère pathologique du trouble.

A noter que l'anxiété de séparation commence et disparaît habituellement pendant l'enfance. Elle peut toutefois persister à l'adolescence ou à l'âge adulte et se manifester par des caractéristiques propres à chaque âge.

3- diagnostic positif

Critères diagnostiques du DSM 5 d'une anxiété de séparation :

A. Anxiété excessive et inappropriée concernant la séparation avec la maison ou les personnes auxquelles le sujet est attaché, comme en témoignent au moins 3 des manifestations suivantes:

- (1) détresse excessive et récurrente dans les situations de séparation.
- (2) crainte excessive et persistante concernant la disparition des principales figures d'attachement.
- (3) crainte excessive et persistante qu'un événement malheureux ne vienne séparer l'enfant de ses principales figures d'attachement.

N° Validation : 0869201959

- (4) réticence persistante d'aller à l'école, ou ailleurs, en raison de la peur de la séparation.
- (5) appréhension persistante à rester à la maison seule ou sans l'une des principales figures d'attachement, ou bien dans d'autres environnements sans des adultes de confiance.
- (6) réticence persistante ou refus d'aller dormir sans être à proximité de l'une des principales figures d'attachement, ou bien d'aller dormir en dehors de la maison.
- (7) cauchemars répétés à thèmes de séparation.
- (8) plaintes somatiques répétées lors des séparations ou en anticipation de telles situations.

B. La durée du trouble est d'au moins quatre semaines.

C. Le trouble débute avant l'âge de 18 ans.

D. Le trouble entraîne une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, scolaire, ou dans d'autres domaines importants.

E. Le trouble ne survient pas exclusivement au cours d'un trouble envahissant du développement, d'une schizophrénie ou d'un autre trouble psychotique et, chez les adolescents et les adultes, il n'est pas mieux expliqué par le diagnostic de trouble panique avec agoraphobie.

Objectif 5 : Différencier les troubles anxieux du trouble obsessionnel compulsif et de l'état de stress post-traumatique, à partir des données anamnestiques et cliniques.

1- Trouble obsessionnel compulsif

Le trouble obsessionnel compulsif (TOC) est défini, selon le DSM-5, par la coexistence d'obsessions et de compulsions (dans plus de 90 % des cas). Les formes pures, obsessionnelles ou compulsives, sont très rares.

Les obsessions sont des idées, des pensées, des impulsions ou des représentations persistantes qui sont vécues comme intrusives et inappropriées et qui entraînent une anxiété ou une souffrance importante.

Les compulsions sont des comportements répétitifs (p. ex., se laver les mains, ranger dans un certain ordre, vérifier) ou des actes mentaux (p. ex., prier, compter, répéter des mots de manière silencieuse) dont le but est de prévenir ou de réduire l'anxiété ou la souffrance et non de procurer plaisir ou satisfaction.

Il existe 3 types d'obsessions :

- Les obsessions idéatives ou « folie du doute » concernent les doutes et les scrupules, la crainte d'un oubli ou d'une erreur. Les thèmes les + fréquents: Métaphysique (vie, mort,

le pourquoi, le comment), religieux (existence ou non d'un dieu), moral (rumination d'image généralement obscène). Il y a une interrogation sur la responsabilité qu'il a pu avoir ou qu'il pourrait avoir dans certains actes passés présents ou futurs et pouvant être préjudiciables pour autrui (crainte d'être à l'origine d'un accident, de mettre le feu par mégarde, de ne pas avoir fermé la porte à clé, de commettre une erreur dans un compte). Si ce sont des images mentales, elles sont souvent horribles (rapports sexuels contre nature...)

- Les obsessions phobiques concernent l'évocation forcée et répétée de certains objets ou situations dont la seule pensée engendre l'angoisse (en l'absence réelle de cet objet ou situation). Les thèmes renvoient aux notions de : propreté, saleté, contamination, contracter une maladie, être victime d'une affection organique ou de devenir fou...Elles entraînent souvent des conduites d'évitement (évitement du contact caractérisant « le délire du toucher », évitement des sujets malades...).
- Les obsessions impulsives, appelées aussi phobies d'impulsion, consistent à craindre de faire un acte agressif (pousser quelqu'un par la fenêtre, tuer son enfant avec un couteau), ou un acte indécent (dire des grossièretés aux femmes dans la rue). La lutte anxieuse est intense, la culpabilité est très grande ; mais l'acte redouté n'est jamais commis, tout au plus est-il ébauché. Le contraste est parfois frappant entre la volonté consciente du sujet et l'acte « extrême » redouté.

Les compulsions, on les appelle souvent des rituels. Ces rituels peuvent être de :

- vérification (vérifier que la lumière est éteinte, que le gaz est fermé, que la serrure est bouclée à double tour)
- rangement (l'arrangement d'objets de façon excessivement ordonnée comme les livres d'une bibliothèque par taille strictement décroissante)
- ramassage (emballages usagés, vieux cotons...);
- lavage (ménage de la maison, douches répétées, lavage de mains), bien au-delà de l'hygiène nécessaire.
- actes mentaux : l'arithmomanie (ou fait de compter sans cesse, ou d'additionner entre elles des dates), les formules conjuratoires (faire une prière avant de passer sous une porte, dire une phrase magique avant de monter dans sa voiture).

2- Etat de stress post-traumatique (ou Trouble stress post traumatique selon le DSM 5)

L'état de stress post-traumatique est définie comme un trouble après un temps de latence dont le sujet a été exposé à un événement traumatique dans lequel le sujet a vécu, a été témoin, a été confronté à un ou des événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être gravement blessés, ont été menacés de mort ou de grave blessure, ou bien durant lesquels son intégrité physique ou celle d'autrui a pu être menacée. La réaction du sujet à l'événement s'est traduite par une peur intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur.

La triade clinique de l'état de stress post-traumatique est : le syndrome de répétition (reviviscence du traumatisme), les conduites d'évitement (de tout stimuli évoquant le traumatisme) et l'hyperactivité neurovégétative (irritabilité, difficulté de concentration, réaction de sursaut).

Les autres signes de l'état de stress post-traumatique sont : l'hypervigilance, les troubles du sommeil, les troubles cognitifs, les troubles psychosomatiques et les autres manifestations anxieuses.

Objectif 6 : Etablir les diagnostics différentiels des troubles anxieux.

1- Affections médicales générales

Des affections médicales générales variées peuvent causer des symptômes anxieux notamment :

- Les affections endocriniennes (p. ex., hyper et hypothyroïdie, phéochromocytome, hypoglycémie),
- Les affections cardio-vasculaires (p. ex., OAP, insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire, arythmie),
- Les affections respiratoires (p. ex., asthme, broncho-pneumopathie chronique obstructive, pneumonie),
- Les affections métaboliques (p. ex., anémie, déficit en vitamine B12, porphyrie),
- Les affections neurologiques (p. ex., Epilepsie, migraines, SEP, tumeurs, dysfonction vestibulaire, encéphalite).

2- Prise de substance

Une **intoxication** par une substance appartenant aux classes de substances suivantes: alcool ; amphétamines et substances amphétaminiques; caféine; cannabis; cocaïne; hallucinogènes;

N° Validation : 0869201959

solvants volatils; phencyclidine et substances similaires, autres substances ou substances inconnues.

Le **sevrage** à une substance appartenant aux classes de substances suivantes : alcool ; cocaïne; sédatifs, hypnotiques et anxiolytiques ; autres substances ou substances inconnues.

Les médicaments qui ont été rapportés comme pouvant provoquer des symptômes anxieux comprennent les anesthésiques et les antalgiques, les sympathomimétiques ou autres bronchodilatateurs, les anticholinergiques, l'insuline, les préparations thyroïdiennes, les contraceptifs oraux, les anti-histaminergiques, les médicaments antiparkinsoniens, les corticostéroïdes, les médicaments antihypertenseurs et cardiovasculaires, les anticonvulsivants, le carbonate de lithium, les médicaments antipsychotiques et les antidépresseurs. Les métaux lourds et les toxiques (p. ex., substances volatiles comme l'essence et la peinture, les insecticides organophosphorés, les gaz nerveux, l'oxyde de carbone, le dioxyde de carbone) peuvent également causer des symptômes anxieux.

3- Affections psychiatriques

- Les troubles dépressifs
- Les signes négatifs de la schizophrénie
- Les troubles de l'adaptation
- L'hystérie
- L'hypochondrie
- Trouble de la personnalité type limite surtout (Borderline).

Objectif 7 : Planifier la conduite du traitement symptomatique et du traitement de fond des différents troubles anxieux.

1- Les objectifs de la prise en charge

- * Rémission des symptômes anxieux.
- * Améliorer la qualité de vie du patient.
- * Prévenir les rechutes.

2- Les moyens thérapeutiques

-L'hospitalisation : indiquée en cas de complications (dépression, crise suicidaire et conduites addictives).

-Traitement médicamenteux

Le traitement symptomatique (Psycholeptiques ou Anxiolytiques ou Tranquillisants)

Les benzodiazépines.

Les carbamates (Méprobamate : Equanil®).

Les bêta-bloquants (Propranolol : Avlocardyl®).

Les antihistaminiques (Hydroxézine : Atarax®).

Le traitement de fond

Les antidépresseurs tricycliques (Clomipramine : Anafranil®).

Les ISRS (Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine) :
Paroxétine/Floxétine/Sertraline/Escitalopram.

Les IRSSNA (Inhibiteurs de la Recapture Sélectifs de la Sérotonine et la Noradrénaline) :
Venlafaxine.

IMAO (Les Inhibiteurs de la Mono-Amine-Oxydase) : Toloxatone : Humoryl®.

Autres antidépresseurs : Tianeptine (Stablon®).

A noter que la Paroxétine possède l'AMM pour le traitement de tous les troubles anxieux.

-Psychothérapies

-Mesures associées

- ❖ Règles hygiéno-diététiques.
- ❖ Information.
- ❖ Psychoéducation.

3- Les indications du traitement

a-Trouble panique

Traitement des attaques de panique (traitement symptomatique) :

-Techniques de relaxation: Patient allongé ou assis confortablement effectue une relaxation musculaire progressive des pieds jusqu'à la tête.

-Contrôle respiratoire : Modification du rythme respiratoire : + lent et + superficiel avec respiration abdominale. Exercice respiratoire : inspiration par le nez pendant 3 à 5 secondes, puis expiration par la bouche, puis repos pendant 3 à 5 secondes.

-Contrôle cognitif : Défocalisation de l'attention des menaces externes et des sensations internes anxiogènes. Contrecarrer les pensées intrusives de mort, de perte de contrôle, d'IDM.

-Psychoéducation : L'information a une valeur thérapeutique en soi.

-Prescription médicamenteuse :

N° Validation : 0869201959

*Éviter une prescription systématique, car le patient ne doit pas conserver en mémoire une issue uniquement « médicalisée » de sa crise,

*Cela permet un meilleur contrôle du sujet de son anxiété, d'éviter la dépendance aux structures de soins et d'épargner les risques d'automédication.

*Indiquée si la crise se prolonge malgré les mesures décrites ci-dessus, si les symptômes sont très intenses ou s'il s'agit d'une crise dans le cadre d'une affection somatique ou d'une urgence psychiatrique (mélancolie anxieuse).

Choix de la molécule : Les BZD +++ : Action sédatrice, anxiolytique et myorelaxante.

½ vie intermédiaire : Lorazépam (Temesta). Voie d'administration : orale et sub-linguale préférables à la voie IM. La prescription doit rester strictement ponctuelle. Elle peut être relayée par une prescription courte (< 1 semaine) si persistance de symptômes anxieux, avec arrêt progressif.

Traitement du trouble panique (Traitement de fond (préventif)) :

Le traitement médicamenteux curatif de fond du trouble panique repose sur l'utilisation d'antidépresseurs ayant pour cible l'axe sérotoninergique. Parmi ceux-ci les ISRS et les IRSNA qui sont plus tolérés et sont le traitement de première intention. Les antidépresseurs tricycliques comme la Clomipramine (Anafranil®) sont des traitements de 2^{ème} intention vue leurs effets secondaires. Les IMAO (inhibiteurs de monoamine oxydase) sont rarement utilisés vue leurs effets secondaires. Il est recommandé de débiter à moitié dose des antidépresseurs et augmenter après une semaine. Les anxiolytiques peuvent être prescrit en début du traitement et arrêté ensuite progressivement. Les psychothérapies type TCC avec la relaxation associée aux méthodes de désensibilisation et d'exposition sont efficaces.

b-Trouble anxiété généralisée

Mesures générales : Informer le patient sur sa maladie. Les mesures hygiéno-diététiques comportant l'arrêt de l'alcool et du tabac, la diminution de la consommation de café, la pratique régulière de l'exercice physique. Le plan de traitement est personnalisé : comporte une psychothérapie structurée et un traitement médicamenteux.

Psychothérapies : Les thérapies cognitivo-comportementales +++ : Elles visent à clarifier les circonstances de survenue des troubles, identifier les pensées irrationnelles afin de les évaluer et de les modifier par la réorganisation des attitudes inadaptées. Elles associent la relaxation musculaire appliquée, des expositions répétées à des situations évitées et une restructuration cognitive des interprétations catastrophiques sur les soucis surévalués.

N° Validation : 0869201959

Traitements médicamenteux :

Les benzodiazépines : Recommandés quelle que soit leur $\frac{1}{2}$ vie. L'effet anxiolytique rapide sur les signes somatiques d'anxiété.

La Buspirone (Buspar: 15 à 30 mg/j). Non commercialisée en Tunisie. Elle a un effet anxiolytique surtout pour les signes psychiques d'anxiété. Le délai d'action peut atteindre 3 semaines. L'arrêt n'entraîne pas de syndrome de sevrage ou de dépendance.

Antidépresseurs : Venlafaxine : efficace dans le contrôle des signes psychiques d'anxiété, Paroxétine

Médicaments efficaces dans le TAG et n'ayant pas l'AMM dans cette indication: L'Hydroxyzine (antihistaminique H1 : Atarax), l'imipramine,

La combinaison du traitement médicamenteux aux TCC ou psychothérapie analytique constitue une alternative très intéressante. La durée du traitement du TAG est de 6 mois au moins. Quelles que soient les modalités thérapeutiques, une réévaluation est faite 1 à 2 semaines après la 1ère consultation puis toutes les 6 semaines.

c-Agoraphobie

Le traitement de première intention est la Paroxétine. Les anxiolytiques peuvent être prescrits en cas d'exacerbation anxieuse aiguë. Les psychothérapies d'orientation cognitive et comportementale avec notamment des techniques de relaxation couplées aux méthodes d'exposition et d'immersion dans les situations phobogènes peuvent être utilisées aussi.

d-Phobies spécifiques

Les phobies simples : ne réclament la plupart du temps pas de traitement.

Enfin, chez des patients souffrant des phobies invalidantes ou de phobies étendues multiples, les ISRS et les IRSNA ont une efficacité intéressante.

e-Phobie sociale

Les antidépresseurs type ISRS (Paroxétine et Sertraline) ont montré leur efficacité dans le traitement du fond des phobies sociales. Le propranolol est efficace sur les symptômes somatiques de l'anxiété (il est utilisé 60 à 90 mn avant l'exposition). La TCC (centrée sur l'affirmation de soi, l'exposition graduée et la restructuration cognitive) associée aux antidépresseurs garantit une meilleure efficacité et évite les rechutes.

f-Trouble anxiété de séparation

L'approche proposée est surtout psychologique (TCC) associée à l'aide au maintien d'une bonne insertion scolaire avec des techniques d'exposition graduée à la séparation. La fluoxétine et la sertraline sont indiqués de 2^{ème} intention.

4- Suivi

Délai d'action des AD dans les troubles anxieux est de 2 à 3 semaines.

La durée de traitement des troubles anxieux est en général de 6 à 12 mois.

Le schéma posologique varie en fonction de la pathologie et selon la sévérité du tableau clinique.

Objectif 8 : Décrire les propriétés pharmacodynamiques des anxiolytiques.

1-Les benzodiazépines

Effets thérapeutiques : anxiolytiques, sédatifs (hypnotiques), anticonvulsivants (antiépileptiques) et myorelaxant.

Mécanisme d'action : Agoniste des récepteurs GABA.

Propriétés pharmacocinétique :

*Absorption orale et IV rapides en 30 minutes, mais en IM lente.

*Résorption complète du fait de leur liposolubilité.

*Liaison élevée aux protéines plasmatiques.

*Métabolisme hépatique sauf pour l'Oxazépam (Seresta®).

*Élimination rénale.

*T_{1/2} courte exemple pour Lorazépam : Téresta®, T_{1/2} intermédiaire exemple pour Clonazépam : Rivotril® et T_{1/2} longue exemple pour Diazépam : Valium®.

Les 2 effets secondaires les plus fréquents : Dépendance et troubles de la mémoire.

Le syndrome de sevrage aux benzodiazépines : anxiété, agitation, confusion, convulsion et insomnie.

2-Les carbamates (Méprobamate : Equanil®) : Ils ont une efficacité anxiolytique indéniable.

3-Les bêta-bloquants (Propranolol : Avlocardyl®) : Ils sont utilisés quand l'anxiété est d'intensité moyenne et que la composante somatique en est primordiale. En pratique, c'est dans l'anxiété de performance (trac) que ces conditions d'utilisation sont le mieux réunies.

N° Validation : 0869201959

4-Les antihistaminiques (Hydroxizine : Atarax®) : Ils ont une efficacité anxiolytique modérée.

5-Autres : Agoniste 5HT1A (Buspirone) et Etifoxine (Strésam®).

Objectif 9 : Décrire les règles prescription des anxiolytiques.

-La prescription des anxiolytiques ne doit être envisagée qu'après échec des approches non médicamenteuses.

-Cette prescription doit être la plus courte possible et ne doit pas dépasser les durées préconisées dans le cadre de l'AMM (1 mois au maximum pour le traitement des insomnies et 3 mois au maximum pour le traitement de l'anxiété).

-Il n'y a pas lieu d'associer deux anxiolytiques.

-Cette prescription doit être régulièrement réévaluée quant à son efficacité et ses effets indésirables et il n'y a pas lieu de la reconduire systématiquement.

-Le patient doit être informé des risques liés à cette consommation et accompagné dans l'arrêt de sa consommation dont on sait qu'il peut être difficile quand la dépendance est installée.

- L'arrêt d'un anxiolytique quel qu'il soit doit toujours être progressif, en prévenant le patient du risque de réapparition transitoire des symptômes initiaux. Si le traitement a été récemment installé, son arrêt va s'effectuer en réduisant de 25 % la posologie toutes les semaines pendant un mois. Si le patient a développé une dépendance au produit, son arrêt va se faire beaucoup plus progressivement en réduisant la dose par 1/2 ou 1/4 tous les 15 jours.

Objectif 10 : Citer les méthodes psychothérapeutiques qui s'appliquent à la prise en charge des différents troubles anxieux

- ✓ TCC (Thérapie Cognitive et Comportementale).
- ✓ Psychanalyse.
- ✓ Thérapie d'inspiration analytique.
- ✓ Hypnose.
- ✓ Thérapie à médiation corporelle essentiellement la relaxation.
- ✓ Psychothérapie de soutien.
- ✓ Psychothérapie familiale systémique.

CONCLUSION

Bien que les troubles anxieux soient des pathologies fréquentes, ils sont encore sous-diagnostiqués. Ces troubles sont associés à une altération marquée du fonctionnement et à une souffrance psychologique du patient. Les antidépresseurs associés aux traitements psychologiques en l'occurrence la TCC constitue la base du traitement.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- 1- Antoine PELISSOLO. Troubles anxieux et névrotiques. EMC de Psychiatrie, 2012 S1634-6939(12)48040-1.
- 2-Julien-Daniel GUELFY et Frédéric ROUILLON. Livre Manuel de psychiatrie. Edition Masson, 2012.